




# LII Olimpiada Matemática Española

Primera Fase

Primera sesión

Viernes mañana, 15 de enero de 2016



1. Con baldosas cuadradas de lado un número exacto de unidades se ha podido embaldosar una habitación de superficie 18144 unidades cuadradas de la siguiente manera: el primer día se puso una baldosa, el segundo dos baldosas, el tercero tres, etc. ¿Cuántas baldosas fueron necesarias?
2. Hemos empezado la Olimpiada Matemática puntualmente a las 9:00, como he comprobado en mi reloj, que funcionaba en ese momento correctamente. Cuando he terminado, a las 13:00, he vuelto a mirar el reloj y he visto que las manecillas se habían desprendido de su eje pero manteniendo la posición en la que estaban cuando el reloj funcionaba. Curiosamente las manecillas de las horas y de los minutos aparecían superpuestas exactamente, una sobre otra, formando un ángulo (no nulo) menor que  $120^\circ$  con el segundero. ¿A qué hora se me averió el reloj? (Dar la respuesta en horas, minutos y segundos con un error máximo de un segundo; se supone que, cuando funcionaba, las manecillas del reloj avanzaban de forma continua).
3. Sea  $ABC$  un triángulo rectángulo en  $C$  no isósceles con catetos  $b > a$ .
  - i) Hallar el lado del cuadrado  $AXYZ$  que circunscribe al triángulo  $ABC$  (los vértices  $B$  y  $C$  tienen que estar en lados distintos del cuadrado) en función de  $a$  y  $b$ .
  - ii) Explicar paso a paso cómo construir el cuadrado  $AXYZ$  con regla y compás.

**No está permitido el uso de calculadoras.  
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.  
El tiempo de cada sesión es de 3 horas y media.**




# LII Olimpiada Matemática Española

Primera Fase

Segunda sesión

Viernes tarde, 15 de enero de 2016



4. Las tres raíces del polinomio  $x^3 - 14x^2 + Bx - 84$  son los lados de un triángulo rectángulo. Hallar  $B$ .
5. En un triángulo  $ABC$  la bisectriz por  $A$ , la mediana por  $B$  y la altura por  $C$  son concurrentes y además la bisectriz por  $A$  y la mediana por  $B$  son perpendiculares. Si el lado  $AB$  mide una unidad, hallar cuánto miden los otros dos lados.
6. De cuántas formas se pueden colorear los vértices de un polígono con  $n \geq 3$  lados usando tres colores de forma que haya exactamente  $m$  lados,  $2 \leq m \leq n$ , con los extremos de colores diferentes?

**No está permitido el uso de calculadoras.  
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.  
El tiempo de cada sesión es de 3 horas y media.**